Réunion inter-régionale Du CR3PA
Amiens
Mars 2025

Symptomatologie frontale (SF)
Regards croisés

Dr Florence Lebert
Psycho-gériatre
CMRR CHU Lille – UCC Bailleul

Absence de conflits d'intérêt

Masques « Psychiatriques » d'un Syndrome Frontal (SF)

RAPPEL

Etiologies des manifestations psychiatriques de la personne âgée

- **Lésions neurologiques en 1°**
 - *Localisation:* → **SYNDROME FRONTAL**
 - *Neurotransmetteurs*
 - Confusion, (somatique, iatrogénie, toxiques)
 - Iatrogénie non confusionnelle, + *Toxiques*
 - Douleurs et inconforts
 - Psychopathologie - patho psychiatriques
 - Environnement
- Ou plusieurs de ces étiologies ...

PREAMBULE

Syndrome frontal, c'est quoi ?

Les signes d'un dysfonctionnement cérébral

Du lobe frontal ou des régions connectées avec

- Des signes cognitifs (identifiés en bilan mémoire)
- Des signes comportementaux pouvant ressembler à une maladie PSY

Ex d'OUTILS de DEPISTAGE des troubles du comportement

-Par l'Echelle EDF:

-Par Inventaire du syndrome dyséxécutif Comportemental du GREFEX

1-Troubles du contrôle de soi comparativement au comportement antérieur de la personne

□ **Changement des goûts alimentaires**

- préférence nouvelle pour les sucreries
- attirance pour des aliments spécifiques
- augmentation de la ration alimentaire
- porte des objets non alimentaires à la bouche
- abus ou attirance inhabituelle pour les boissons alcoolisées
- abus ou attirance inhabituelle pour des médicaments ou des toxiques, drogues

□ **Désinhibition**

- fait des remarques sans tenir compte des règles sociales, perte du tact
- non respect des règles en voiture
- recherche de contacts sociaux inhabituels (parle avec n'importe qui, ou des personnes en particulier, enfants,...)
- dépenses excessives
- perte de la décence
- parle sans retenue de sujets de sexualité, ou fait des avances

□ **Perte de la patience, irritabilité**

- **Instabilité psychomotrice** (hyperactivité physique à toute heure, incapacité à rester en place, se lève sans cesse du fauteuil, veut toujours sortir de la maison, a du mal à rester au lit)

2-Négligence physique et domestique par rapport aux habitudes antérieures

- Réduction des habitudes de toilettes, négligence de l'hygiène personnelle
- Négligence de l'harmonie des vêtements, de leur entretien (boutons, ourlets, ..), indifférence aux tâches
- Réduction de l'entretien des cheveux ou des ongles
- Négligence du domicile

3-Troubles affectifs, émotionnels au long cours comparativement à l'état antérieur

- Réduction de l'expressivité du visage
- Indifférence, manque d'empathie (indifférence surtout vis à vis des membres de famille, impression de devenir égoïste)
- Euphorie (gaîté inhabituellement fréquente et pas toujours adaptée)
- Anxiété au long cours excessive

4-Apathie et comportements persévérants comparativement aux comportements antérieurs

- Apathie, pertes d'initiatives, nécessité d'être stimulé pour initier quelque chose, avec parfois somnolence ou immobilisme lors de manque de stimulation
- Perte d'intérêt social (information, événements publics, relations...), préférence pour le domicile et la solitude
- Idées fixes
 - sur l'argent avec tendance à l'avarice, ou sur l'heure des repas, ou sur un type d'aliments, ou sur le tabac, ou sur les enfants, ou sur les animaux,
 - sur la religion ou les théories politiques,
 - difficultés à changer d'opinion
 - plaintes physiques répétées
- Comportements stéréotypés, tics, rites, ex :
 - extinction sans cesse des lumières, déplacement sans cesse aux toilettes, frappe dans ses mains, manipule ses boutons d'habits, tire ses cheveux, utilise abondamment des cosmétiques (parfums, rouge à lèvres...) fait constamment des jeux (mots mêlés, question pour un champion...), collectionnisme, achats par correspondance répétés

Echelle de Dysfonctionnement Frontal (EDF)

Lebert & Pasquier

[//www.centre-alzheimer-jeunes.fr/les-degenerescences-lobaire-fronto-temporales/](http://www.centre-alzheimer-jeunes.fr/les-degenerescences-lobaire-fronto-temporales/)

- Troubles du contrôle de soi: 0 / 1
- Négligence physique: 0 /1
- Troubles de l'humeur: 0 / 1
- Réduction de l'intérêt et persévérations : 0 /1

● Score total sur 4

● ≥ 3 , pensons au syndrome frontal

Cas clinique

**L'EMPG est demandée
pour un état dépressif résistant
chez Mme V, 84 ans,**

**Vivant en EHPAD depuis 2 ans
Où elle est entrée en raison d'une réduction
de la marche suite à 2 chirurgies de hanche**

- **SF comportemental**
 - EDF à 2, voir 3 sur 4
- **Syndrome dyséxécutif**
 - BREF diminuée (< 12)
- **Facteurs de risque vasculaires**
- **Résistance aux antidépresseurs**

- **➔ demande d'une IRM cérébrale**
 - importante leucopathie et lacune thalamique G

Les tableaux « psy » du SF en gériatrie :

- **Pseudo-dépression**, apathie, réduction expression verbale, monotonie de l'humeur, indifférence
- **Syndrome Diogène**, négligence physique et du lieu de vie
- **Pseudo Hypomanie**, perte de la retenue verbale et comportementale, désinhibition
- **Addictions**
- **Trouble de personnalité**
- **Conflit conjugal**, dont trouble des conduites sexuelles
- *SF, pas qu'un mode d'expression « psy »*

Les difficultés diagnostiques en gériatrie :

- Nécessité de comparer avec l'état antérieur → **nécessité d'un aidant**... Danger du manque d'informations
- **Polypathologie**
- **Polymédication**
 - NRL, antipsychotiques
 - Fatigue iatrogénique ...

Qu'est ce qui doit vous faire penser plus à du neurologique, à des lésions cérébrales ?

1. *Pas d'antécédent de pathologie psychiatrique = début tardif*
2. *Atypies cliniques*
3. *Faible réponse aux traitements et effets indésirables rapides*
4. *Déficit cognitif et réduction autonomie*

Qu'est ce qui doit vous faire penser plus à Un syndrome frontal après 60 ans

1. *Atypies pour une maladie PSY*
2. *Syndrome frontal comportemental, échelles*
3. *Syndrome frontal cognitif, bilan neuropsychologique*

→ *demande d'Imagerie cérébrale*

Les étiologies classiques SF en gériatrie:

-
- Trauma crânien
 - La pathologie tumorale
 - L'Hydrocephalie Pression Normale
 - Paranéoplasiques
 - L'épilepsie
 - Maladies de système et infectieuses
 - Les pathologies psychiatriques endogènes (bipolaires)
 - La démence alcoolique
 - **La pathologie dégénérative ++**
 - MA tardive-Mixte ++
 - Dégénérescence lobaire fronto-tempoale
 - Parkinson – maladie à corps de LEWY
 - **La pathologie vasculaire ++**
 - Hématome sous dural
 - AVC Cérébrale antérieure
 - Dysconnexion par lésions de la substance blanche ++

Intérêt de l'imagerie: IRM /TEP

Utilité de penser au syndrome frontal:

- Prises en charge très différentes en fonction de l'étiologie
- Choix des traitements et de la prise en charge dépend de l'étiologie
- Danger des interprétations psychologiques des modifications du comportement... pour le malade et ses proches et aussi pour l'équipe soignante

MERCI pour votre ATTENTION ...