Lumière sur les troubles cognitifs : Et si les médicaments anticholinergiques agissaient dans l'ombre ?

Dr. Céline VAESKEN

Pharmacien Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet âgé

Mardi 4 mars 2025

Les médicaments anticholinergiques

→ Utilisés pour traiter **diverses pathologies**

Fésotérodine TOVIAZ
Oxybutinine DITROPAN
Solifénacine VESICARE

Antispasmodiques
urinaires

Amitryptiline LAROXYL
Paroxetine DEROXAT

Antidépresseurs

Anti-histaminiques

Hydroxyzine ATARAX
Alimemazine THERALENE

Antiparkinsoniens

Trihexyphenidyle PARKINANE

Neuroleptiques

Cyamemazine TERCIAN
Quetiapine XEROQUEL
Clozapine LEPONEX
Olanzapine XYPREXA

Les effets indésirables des médicaments anticholinergiques

➔ 2 types d'effets indésirables (EI) anticholinergiques :
Effets centraux et périphériques

➔ Certains traversent la barrière hémato-encéphalique et peuvent exercer des effets anticholinergiques centraux.

— Effets indésirables centraux
— Effets indésirables périphériques

Les effets indésirables des médicaments anticholinergiques

Charge anticholinergique

Echelle ACB

Anticholinergic Cognitive Burden

1 = anticholinergique faible
2 = anticholinergique modéré
3 = anticholinergique puissant

Exposition cumulée aux anticholinergiques

> 3 : Impact cognitif global

- 13 échelles permettent de calculer le score anticholinergique
- Ne prend pas en compte la posologie
- Pas un outil français

Exemple :

Médicaments (DCI)	Score CIA	Classe thérapeutique	Score ACB	Classe thérapeutique
paroxetine	2	Antidépresseur	3	Antidépresseur
loxapine	2	Antipsychotique	2	Antipsychotique
solifenacine	3	Antispasmodique urinaire	#N/A	#N/A

Particularités chez la personne âgée

- Polypathologie, polymédication et fragilité
- Troubles neurocognitifs plus élevée chez les personnes âgées.
- ↗ passage de la barrière hématoencéphalique (BHE) des médicaments
- ↘ métabolisme de la fonction hépatique
- ↘ métabolisme de la fonction rénale

Accumulation des anticholinergiques

Normandie

1 sujet âgé sur 10 (75 ans et plus) est traité par une **molécule anticholinergique**

Lien entre le système anticholinergique et la maladie d'Alzheimer

Cholinergic deficits in Alzheimer's disease and the role of treatment

Quantité d'acétylcholine réduite :

- Lésions des neurones cholinergiques
- Diminution du taux acétyltransférase
- Diminution de la captation de la choline

Les anticholinergiques affectent-ils la cognition chez les personnes âgées en bonne santé cognitive ?

Cochrane Database of Systematic reviews | [Review - Prognosis](#)

Charge anticholinergique (facteur pronostique) dans la prédiction de la démence ou du déclin cognitif chez les personnes âgées sans syndrome cognitif connu

Martin Taylor-Rowan, Sophie Edwards, Anna H Noel-Storr, Jenny McCleery, Phyo K Myint, Roy Soiza, Carrie Stewart, Yoon Kong Loke, [✉ Terry J Quinn](#) Authors' declarations of interest

Version published: 05 May 2021 [Version history](#)

Objectif

Évaluer si la **charge anticholinergique**, telle que définie au niveau de chaque échelle individuelle, est un **facteur pronostique de déclin cognitif futur ou de démence** chez les personnes âgées présentant des troubles cognitifs intacts.

Les anticholinergiques affectent-ils la cognition chez les personnes âgées en bonne santé cognitive ?

25 études
observationnelles
968 428 adultes âgés

Suivi de 1 à 11 ans

Age moyen/médian 52 à 82 ans

Méta analyse

4 études

- Charge anticholinergique > 2 ou 3
- Augmentation de 2,6 du risque « de déclin cognitif ou de démence »
- Indépendamment de l'âge, du sexe ou des comorbidités

Analyse descriptive

25 études

- 23 des 25 études ont montré une association entre la prise d'anticholinergiques et un risque accru de déclin cognitif
- Plus la « charge anticholinergique » était importante, plus le risque était élevé

Les anticholinergiques affectent-ils la cognition chez les personnes âgées présentant déjà des troubles cognitifs légers ou une démence?

Base de données Cochrane des revues systématiques | - Pronostic

Charge anticholinergique pour la prédiction du déclin cognitif ou des symptômes neuropsychiatriques chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers ou de démence

Martin Taylor-Rowan, Olga Kraia, Christina Kolliopoulou, Anna H Noel-Storr, Ahmed A. Alharthi, Amanda J Cross, Carrie Stewart, Phyo K Myint, Jenny McCleery, ✉ Terry J Quinn Déclarations d'intérêts des auteurs

Version publiée le : 22 août 2022 Historique des versions

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD015196.pub2>

Objectif

Evaluer si la **charge anticholinergique**, telle que définie au niveau de chaque échelle individuelle, était un **facteur pronostique de déclin cognitif ultérieur ou de troubles neuropsychiatriques** chez les personnes âgées ayant déjà reçu un **diagnostic de démence ou de déficience cognitive**.

Les anticholinergiques affectent-ils la cognition chez les personnes âgées présentant déjà des troubles cognitifs légers ou une démence

17 études
observationnelles
102 684 *adultes âgés*

Age moyen/médian 72 à 88 ans

Résultat hétérogène

- Aucune conclusion n'a pu être tirée entre la charge anticholinergique et la progression du déclin cognitif chez les personnes âgées dont la **cognition est déjà réduite**
- Un lien est possible entre une « **charge anticholinergique** » élevée et **une mortalité accrue**

Limites des études

- Biais de publication
- Biais d'indication
 - Certains médicaments ont pu être introduit en raison de symptômes prodromiques de démence
- Pas d'étude sur des médicaments spécifiques
 - Etude faite sur la charge anticholinergique

Déprescription des médicaments anticholinergiques

Pas de preuves scientifiques : Réduction ou l'arrêt (*deprescribing*) des médicaments anticholinergiques peut améliorer ou stabiliser la cognition chez les personnes âgées.

Arrêt brutal = symptômes de sevrage

→ Symptômes peuvent survenir quelques jours après l'arrêt et jusqu'à 6 à 8 semaines

→ Réduire progressivement (25 à 50% toutes les semaines)

Que disent les recommandations ?

Prévention de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées

- Éviter/limiter la consommation des **médicaments anticholinergiques** listés comme classiquement **inappropriés chez la personne âgée**.
- Ces molécules **ne doivent être prescrites qu'en l'absence d'alternative**, à dose minimale efficace et en réalisant une surveillance rapprochée des effets cognitifs.

NICE National Institute for Health and Care Excellence

Dementia: Assessment, management and support for people living with dementia and their carers

- **Limiter la charge anticholinergique**, rechercher des alternatives :

 - Quand une personne présumée atteinte de démence doit être orientée vers un spécialiste en vue du diagnostic
 - Lors d'une **revue de médication** chez les personnes atteintes de démence.

Les revues de médicaments

Optimedoc

➔ Réévaluation des traitements

Pluridisciplinaire

Diminuer la iatrogénie

Exemple

Madame X. 85 ans

Motif de la demande d'avis géro-psycho-geriatrique : Tentative de suicide par IMV

Traitement	Score	Indication	Modification
Paroxetine 20mg cpr 1-0-0	3	Episode dépressif caractérisé	Sertraline 50mg gel 1-0-0
Melatonine LP 2mg gel 0-0-0-1	/	Trouble du sommeil	
Candesartan 8mg cpr 1-0-0	/	Hypertension artérielle	
Paracetamol 1g cpr 1-1-1	/	Prise en charge de la douleur	
Cholecalciferol 50 000UI 1 ampoule/mois	/	Carence en vitamine D	

Mauvaise tolérance de la paroxetine : Eléments d'allure hallucinatoire, céphalée, insomnie
Trouble cognitif : Difficulté à restituer son parcours de vie et les dates importantes

Conclusion

- Regarder l'ensemble la prescription

- Attention aux effets indésirables au long cours

- Solliciter le pharmacien

Lumière sur les troubles cognitifs : Et si les médicaments anticholinergiques agissaient dans l'ombre ?

Dr. Céline VAESKEN

Pharmacien Unité Mobile de Psychiatrie du Sujet âgé

Mardi 4 mars 2025